

# LA PNEUMOCOCCIE EST UNE MALADIE GRAVE, MAIS ÉVITABLE.

Le terme « pneumococcie » désigne toutes les infections causées par la bactérie *Streptococcus pneumoniae*, comme la **méningite** ou la **pneumonie** bactériémique.

ÊTES-  
VOUS À  
RISQUE?



**Vous présentez un risque accru de pneumococcie si un des éléments suivants correspond à votre situation :**



Âge supérieur à 65 ans



Tabagisme



Vie en établissement de soins de longue durée



Alcoolisme



Présence d'au moins une des affections suivantes :

Système immunitaire affaibli

Maladie hépatique

VIH

Diabète

Cardiopathie

Cancer

Maladie pulmonaire (incluant l'asthme et la MPOC)

Grefe d'organe

Atteinte rénale

Affection neurologique

**Interrogez votre professionnel de la santé sur Prevnar<sup>MD</sup> 13.**

Prevnar 13 est un vaccin antipneumococcique administré aux enfants de 6 semaines à 17 ans ainsi qu'aux adultes de 18 ans ou plus afin de contribuer à la protection du vacciné contre 13 types de pneumocoque (bactérie *Streptococcus pneumoniae*). Prevnar 13 contribue à vous protéger ou à protéger votre enfant contre des maladies causées par treize types de pneumocoque, telles que la méningite, la sepsie ou la bactériémie (présence de bactéries dans le sang) et la pneumonie bactériémique.

Si vous avez **plus de 65 ans** ou **plus de 18 ans** et que **vous présentez un des facteurs de risque ci-dessus**, parlez-en à votre professionnel de la santé.

Prevnar 13 ne doit pas être administré aux personnes allergiques (hypersensibles) aux substances actives, à tout autre ingrédient du produit ou à tout autre vaccin qui contient de l'anatoxine diphtérique.

Faites particulièrement attention avec Prevnar 13 si :

- vous avez ou avez eu des problèmes médicaux après avoir reçu une dose de Prevnar ou de Prevnar 13;
- vous avez une forte fièvre;
- vous avez un trouble de la coagulation.

Prevnar 13 ne prévient que les maladies causées par les types de pneumocoque qui sont dans le vaccin. Voici les effets secondaires les plus fréquents, soit ceux qui ont été observés chez au moins 1 adulte sur 10 : perte d'appétit; maux de tête; diarrhée; éruption; apparition/aggravation de douleurs articulaires; apparition/aggravation de douleurs musculaires; frissons; fatigue; douleur, sensibilité, rougeur, enflure ou durcissement quelconques au point de vaccination; douleur ou sensibilité au point d'injection qui gêne les mouvements du bras. Les effets secondaires fréquents, observés chez au moins 1 adulte sur 100, mais chez moins de 1 adulte sur 10, sont les vomissements (chez les adultes âgés de 50 ans ou plus) et la fièvre. Comme tous les vaccins, Prevnar 13 ne protège pas toutes les personnes qui le reçoivent.